Сак Саламат

Министерство Здравоохранения
и Социального развития
Кыргызской Республики

КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ И СООБЩАТЬ О ПОБОЧНЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ COVID-19

Медицинские работники играют ключевую роль в обеспечении постоянной безопасности вакцин против COVID-19

ПЕРЕД ВАКЦИНАЦИЕЙ

ШАГ 1



СПРОСИТЕ

была ли когда-нибудь у вакцинируемого человека острая аллергическая реакция на вакцины

Если ДА, перенаправьте человека к аллергологу или другому медицинскому специалисту, который порекомендует дальнейшие действия

ШАГ 2

ОЦЕНИТЕ

состояние здоровья вакцинируемого, соберите анамнез, учитывая наличие на период вакцинации острых и обострение хронических заболеваний, иммунных состояний, тяжелой аллергии на компоненты вакцины и получение иммуносупрессивной терапии.

ШАГ 3

СООБЩИТЕ

о любых побочных проявлениях после вакцинации, которые указывают на то, что организм человека выстраивает защиту от COVID-19

Возможные побочные проявления включают:

- Боль в руке
- Небольшое повышение температуры
- Усталость
- Головную боль
- Боль в мышцах или суставах

ШАГ 4

ПРОВОДИТЕ ВАКЦИНАЦИЮ

ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ

ШАГ 5

НАБЛЮДАЙТЕ

за вакцинированным человеком в течение 15 минут.

Наблюдайте в течение 30 минут за лицами, у которых в прошлом была аллергическая реакция на вакцину.

ШАГ 6

ПРОИНФОРМИРУЙТЕ

незамедлительно вашего руководителя о **любых неожиданных неблагоприятных** реакциях, выявленных при наблюдении или о тех, о которых было сообщено позже.

Заполните электронную или бумажную форму по побочным проявлениям после иммунизации (ППЛИ), согласно приказу МЗ КР №110 от 15.02.2017г. «Руководство по эпиднадзору за ППЛИ».

После этого, органы здравоохранения займутся расследованием этого случая

В очень редких случаях, побочные реакции могут быть вызваны непосредственно вакцинами. Однако, сообщение о неожиданных побочных проявлениях и их расследование обеспечит, чтобы вакцины против COVID-19 продолжали и дальше соответствовать высоким стандартам качества.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ВАКЦИНАЦИИ

Поприветствуйте. Улыбайтесь. Используйте уважительный стиль общения, внимательно слушайте и задавайте вопросы. Установите хороший зрительный контакт. Говорите уверенным и спокойным голосом. Это поможет установить хороший контакт и получить доверие со стороны пациента к вашим рекомендациям о вакцинации.

Используйте руководящий стиль: «Вам надо получить прививку» или «Молодцы, что вы пришли, сейчас будем делать прививку». Использование этого стиля доказало свою эффективность в работе с пациентами.

Оцените отношение пациента к вакцинации

Если на ваше предложение получить прививку пациент отвечает: «Хорошо, я готов», или «Хорошо, наверное, я буду прививаться» и не задают других вопросов, переходите на **Вставку «Согласие на вакцинацию».**

Если на ваше предложение получить прививку пациент отвечает: «Я подумаю насчет прививки», «У меня есть сомнения и страхи по поводу вакцинации», переходите на **Вставку «Сомнения в вакцинации».**

Если на ваше предложение получить прививку пациент отказывается от вакцинации, переходите на **Вставку «Отказ от вакцинации».**

Согласие на вакцинацию

Похвалите пациента. Информируйте пациента о прививке, которую необходимо получить и возможных проявлениях после вакцинации. Направьте на вакцинацию.



ВАКЦИНАЦИЯ

Сомнения в вакцинации

Определите причины сомнения в вакцинации.
Активно слушайте и отвечайте на вопросы.
Расскажите о вакцинации.
Предоставьте информацию о преимуществах вакцинации.
При необходимости определите источники дезинформации, которые оказывают негативное влияние на попытки убедить сделать прививку.
Укажите достоверные источники информации о вакцинации.

Используйте **подход настоятельных рекомендаций:**

- **Подтвердите,** что вы понимаете опасения или сомнения по поводу вакцинации.
- **Расскажите** о своем положительном опыте по вопросам иммунизации или «Я тоже вакцинировалась».
- **Приведите** научные данные о вакцинации.
- **Дайте** объяснение своим рекомендациям.

Отказ от вакцинации

Выслушайте с уважением причины отказа от вакцинации.

Признайте проблемы пациента и причины отказа от вакцинации. Объясните риски, связанные с отказом от вакцинации. Рекомендуйте вакцинацию или визит в любое другое удобное время и по любым другим вопросам, связанные с проблемами здоровья и дополнительной информацией по вопросам вакцинации.